

Сильно эллиптические операторы с сингулярными коэффициентами

М. И. Нейман-заде*, А. А. Шкаликов†

1 февраля 2008 г.

В этой статье мы будем изучать сильно эллиптические операторы

$$L = \sum_{|\alpha|, |\beta| \leq m} D^\alpha c_{\alpha, \beta}(x) D^\beta \quad (1)$$

$$c_{\alpha, \beta}(x) \in \begin{cases} L_\infty, & |\alpha| = |\beta| = m, \\ D', & |\alpha| + |\beta| < 2m, \end{cases}$$

в $\mathbb{R}^n$ порядка $2m$. Используются стандартные обозначения: $D^\alpha = i^{|\alpha|} \frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial^{\alpha_1} x_1 \dots \partial^{\alpha_n} x_n}$, $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ и β — мультииндексы, $|\alpha| = \sum_{j=1}^n |\alpha_j|$.

Пусть также

$$L_0 = \sum_{|\alpha|, |\beta| = m} D^\alpha c_{\alpha, \beta} D^\beta$$

— главная часть оператора L . Напомним (см., например, [1], [2]), что оператор L_0 называется равномерно сильно эллиптическим, если

$$\operatorname{Re} \sum_{|\alpha|=|\beta|=m} c_{\alpha, \beta}(x) \xi^\alpha \xi^\beta \geq \delta |\xi|^{2m}, \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad \xi \in \mathbb{R}^n,$$

где постоянная δ не зависит от x , $\xi \in \mathbb{R}^n$.

Согласно теореме Иосиды (см. [3]), верен следующий факт: *если оператор L_0 равномерно сильно эллиптивен, а коэффициенты $c_{\alpha, \beta}$ непрерывные функции, то выполняется коэрцитивная оценка*

$$\operatorname{Re}(L_0 u, u) \geq \delta \|\nabla^m u\|_{L_2(\mathbb{R}^n)}^2 \quad (2)$$

*Работа поддержана грантом РФФИ N 01-01-00691

†Работа поддержана грантом РФФИ N 00-15-96100

для всех $u \in S$, где S — пространство Шварца, а постоянная δ_1 не зависит от u . Эту оценку называют также неравенством Гординга [2].

В дальнейшем мы нигде не будем использовать непрерывность коэффициентов оператора L_0 , а только их принадлежность пространству L_∞ и оценку (2). Поэтому в случае $c_{\alpha,\beta} \in L_\infty$ далее постулируется справедливость оценки (2).

Из оценки (2) и того, что коэффициенты главной части $c_{\alpha,\beta}$ существенно ограничены, следует, что полуторалинейная форма

$$l_0(u, v) = \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{|\alpha|=|\beta|=m} c_{\alpha,\beta} D^\beta u(x) \overline{D^\alpha v(x)} dx$$

секториальна, замыкаема, и область определения ее замыкания равна $H_2^m(\mathbb{R}^n)$. Поэтому, согласно первой теореме о представлении, существует единственный m -секториальный оператор в пространстве $L_2(\mathbb{R}^n)$, который мы обозначим также через L_0 , такой, что

$$l_0(u, v) = (L_0 u, v), \quad u \in \mathcal{D}(L_0), \quad v \in H_2^m(\mathbb{R}^n).$$

В определении (1) мы предположили, что коэффициенты $c_{\alpha,\beta}(x)$ при $|\alpha| + |\beta| < 2m$ являются распределениями. Основной вопрос, исследуемый в этой главе, — найти достаточные условия на коэффициенты $c_{\alpha,\beta}$, гарантирующие корректное определение L как секториального оператора в $L_2(\mathbb{R}^n)$. Ответ на этот вопрос будет дан в терминах принадлежности коэффициентов пространствам мультипликаторов из соболевского пространства H_2^k в H_2^{-l} . Поскольку точное описание таких пространств сложно, в финальной теореме мы получим достаточные условия принадлежности обобщенных функций этим пространствам в терминах их принадлежности соболевским пространствам с негативными индексами гладкости.

Кроме того, мы показываем "физическую корректность" оператора L . Именно, если $c_{\alpha,\beta,n}$, $|\alpha| + |\beta| < m$ — гладкие функции, сходящиеся к $c_{\alpha,\beta}$ по норме соответствующего пространства мультипликаторов, то последовательность операторов L_n будет сходиться к L в смысле равномерной резольвентной сходимости.

Нам будет удобнее сначала получить результаты в общей форме.

1 Обобщенная сумма секториальных операторов.

Приближения операторных сумм

Напомним, что оператор T в гильбертовом пространстве $\mathfrak{H}$ называется секториальным, если найдутся числа $\theta < \pi/2$ и $M < \infty$ такие, что

$$|Im(Tx, x)| \leq \operatorname{tg} \theta (Re(Tx, x) + M(x, x)), \quad \forall x \in \mathfrak{H}, \quad \|x\| = 1.$$

Секториальный оператор T называется m -секториальным, если внешность сектора $|\operatorname{Im} \lambda| \leq \operatorname{tg} \theta (\operatorname{Re} \lambda + M)$ содержится в резольвентном множестве оператора T .

Далее в этом параграфе мы будем предполагать, что T — секториальный оператор в гильбертовом пространстве $\mathfrak{H}$. Пусть $\mathfrak{H}_1$ — гильбертово пространство, плотно вложенное в $\mathfrak{H}$, а оператор T таков, что

$$c_1 \|x\|_1^2 \leq \operatorname{Re}(Tx, x) \leq c_2 \|x\|_1^2 \quad \forall x \in \mathcal{D}(T), \quad (3)$$

где $\|\cdot\|_1$ — норма в $\mathfrak{H}_1$, а постоянные c_1 и c_2 не зависят от x . В этом случае квадратичная форма $\operatorname{Re}(Tx, x)$ допускает замыкание на все пространство $\mathfrak{H}_1$, и, согласно первой теореме о представлении (см. [4, гл. VI.2]), существует равномерно положительный самосопряженный оператор T_0 такой, что

$$(T_0 x, x) = \operatorname{Re}(Tx, x) \quad \text{при } x \in \mathcal{D}(T_0) \cap D(T),$$

кроме того, $\mathcal{D}(T_0) \subset \mathfrak{H}_1$ и $\mathcal{D}(T_0)$ плотно в $\mathfrak{H}_1$. Известно также, что в этом случае $\mathcal{D}(T_0^{1/2}) = \mathfrak{H}_1$. Через $\mathfrak{H}_{-1}$ обозначим дуальное пространство к $\mathfrak{H}_1$ по отношению к скалярному произведению в $\mathfrak{H}$. В частности, запись (f, g) обозначает как скалярное произведение в $\mathfrak{H}$, так и действие функционала $f \in \mathfrak{H}_{-1}$ на элемент $g \in \mathfrak{H}_1$.

Теорема 1. Пусть H_1, H — пара гильбертовых пространств, причем $\mathfrak{H}_1$ плотно вложено в $\mathfrak{H}$. Пусть T — секториальный оператор в $\mathfrak{H}$, причем выполнена двусторонняя оценка (3). Пусть Q — ограниченный оператор из $\mathfrak{H}_1$ в $\mathfrak{H}_{-1}$, причем выполнена оценка

$$|(Qf, f)| \leq \varepsilon (f, f)_1 + M(\varepsilon)(f, f) \quad \text{для некоторого } \varepsilon < 1. \quad (4)$$

Тогда $T + Q$ — замкнутый ограниченный оператор из пространства $\mathfrak{H}_1$ в $\mathfrak{H}_{-1}$, для которого форма $((T + Q)x, x)$, определенная на $\mathfrak{H}_1$, замкнута и секториальна. Сужение оператора $T + Q$ на $\mathfrak{H}$ (обозначим его $S = T \tilde{+} Q$

и назовем обобщенной суммой) есть m -секториальный оператор в $\mathfrak{H}$. Если последовательность операторов $Q_n : \mathfrak{H}_1 \rightarrow \mathfrak{H}_{-1}$ такова, что

$$\|Q_n - Q\| \rightarrow 0 \quad \text{при } n \rightarrow \infty \quad (5)$$

(здесь берется операторная норма из $\mathfrak{H}_1$ в $\mathfrak{H}_{-1}$), то

$$S_n = T \widetilde{+} Q_n \xrightarrow{R} T \widetilde{+} Q = S. \quad (6)$$

При этом спектры $\sigma(S_n)$ сходятся к спектру $\sigma(S)$ сверху.

Доказательство. Так как T секториальный и выполнена оценка (3), то

$$c_1 \|x_1\|_1^2 \leq |\operatorname{Im}(Tx, x)| \leq c_2 \|x\|_1^2$$

с некоторыми константами $c_1, c_2 > 0$. Тогда T продолжается на $\mathfrak{H}_1$ как замкнутый ограниченный оператор из $\mathfrak{H}_1$ в $\mathfrak{H}_{-1}$. Из условия (4) и теоремы об устойчивости замкнутости (см. [4]) получаем, что $T + Q : \mathfrak{H}_1 \rightarrow \mathfrak{H}_{-1}$ замкнут и ограничен, кроме того, форма $((T + Q)x, x)$, определенная на $\mathfrak{H}_1$, замкнута и секториальна. Согласно первой теореме о представлении, с этой формой ассоциирован m -секториальный оператор $S = T \widetilde{+} Q$ в пространстве $\mathfrak{H}$, который есть сужение оператора $T + Q$ на область

$$\mathcal{D}(S) = \{x | Tx + Qx \in \mathfrak{H}\}.$$

Если операторы Q_n таковы, что выполнено соотношение (5), то при достаточно больших n для Q_n выполняется неравенство (4), а потому определены операторы $T \widetilde{+} Q_n$. Докажем равномерную резольвентную сходимость (6).

Пусть T_0 — оператор в $\mathfrak{H}$, ассоциированный с квадратичной формой $\operatorname{Re}(Tx, x)$ (этот оператор уже был введен в начале параграфа). Так как T_0 равномерно положителен и $\mathcal{D}(T_0^{1/2}) = \mathfrak{H}_1$, то $T_0^{1/2}$ осуществляет изоморфизм $\mathfrak{H}_1$ на $\mathfrak{H}$ и $\mathfrak{H}$ на $\mathfrak{H}_{-1}$.

Поскольку нормы операторов $T + Q_n : \mathfrak{H}_1 \rightarrow \mathfrak{H}_{-1}$ равномерно ограничены, то нормы операторов

$$Z_n = T_0^{-1/2}(T + Q_n)T_0^{-1/2} : \mathfrak{H} \rightarrow \mathfrak{H} \quad (7)$$

также ограничены равномерно. Кроме того, из оценок (4) и (5) следует, что

$$c_1 \|y\|_{\mathfrak{H}}^2 \leq \operatorname{Re}((Z_n + \rho)y, y) \leq c_2 \|y\|_{\mathfrak{H}}^2 \quad \forall y \in \mathfrak{H}$$

с некоторыми константами $c_1, c_2 > 0$, не зависящими от n и y , если ρ — достаточно большое положительное число. Следовательно, числовые образы операторов $Z_n + \rho$ отделены от нуля постоянной $c_1 > 0$. Но тогда, согласно теореме Хаусдорфа, $Z_n + \rho$ обратимы, причем $\|(Z_n + \rho)^{-1}\| \leq c_1^{-1}$.

Теперь доказательство можно закончить так же, как в работе [8]. Имеем

$$\begin{aligned} (T + Q_n - \rho)^{-1} - (T + Q - \rho)^{-1} &= (T + Q_n - \rho)^{-1}(Q - Q_n)(T + Q - \rho)^{-1} = \\ &= T_0^{-1/2}(Z_n + \rho)^{-1}[T_0^{-1/2}(Q - Q_n)T_0^{-1/2}](Z + \rho)^{-1}T_0^{-1/2}, \end{aligned}$$

где Z определен (7), если в этом равенстве опустить индекс n . Очевидно, последнее тождество доказывает равномерную резольвентную сходимость (6). Теорема доказана. $\square$

Замечание 1. В условиях теоремы 1 нельзя утверждать обычную сходимость спектров операторов $T \tilde{+} Q_n$ к спектру $T \tilde{+} Q$. Контрпримеры можно найти даже в случае ограниченных операторов T и Q , действующих в $\mathfrak{H}$ (см., например, [5]). При каких дополнительных условиях сходимость спектров утверждать можно? Укажем одно достаточное условие: T — симметрический оператор, выполнена оценка (4), а $Q : \mathfrak{H}_1 \rightarrow \mathfrak{H}_{-1}$ — компактный оператор. В этом случае сходимость спектров снизу (а значит, и обычную сходимость) можно доказать точно так же, как и в самосопряженном случае.

2 Определение и свойства пространств $M[k, -l]$

Пространство $H_2^s(\mathbb{R}^n)$ наделяется естественным скалярным произведением

$$(f, g)_s = ((1 + x^2)^{s/2} Ff, (1 + x^2)^{s/2} Fg)_{L_2}.$$

Известно (см. [6]), что оператор $(-\Delta + 1)^{\alpha/2}$ осуществляет изоморфизм пространств H_2^s и $H_2^{s-\alpha}$.

Известно также [7], что при целых $s \in \mathbb{R}^+$ эквивалентное скалярное произведение в H_2^s можно задать выражением

$$(f, g)'_s = \sum_{|\alpha| \leq s} (D^\alpha f, D^\alpha g)_{L_2}.$$

Обозначение (f, g) зарезервируем для обозначения действия функционала $f \in H_2^{-s}$ на элемент $g \in H_2^s$ при всех $s \geq 0$, а также действия $f \in D'$ на $g \in D$.

Далее в этом параграфе числа $k, l \geq 0$ не предполагаются целыми.

Пусть $\varphi \in D'$ — обобщенная функция. Определим полуторалинейную форму $(\varphi f, g)$ на $D \times D$ как $(\varphi, f\bar{g})$. Назовем φ мультипликатором из H_2^k в H_2^{-l} (обозначая $\varphi \in M[k, -l]$), если форма $(\varphi f, g)$ продолжается по непрерывности на $H_2^k \times H_2^l$, иными словами, имеет место оценка

$$(\varphi f, g) \leq C \|f\|_k \|g\|_l \quad \text{для всех } \varphi, \psi \in D.$$

В этом случае формой $(\varphi f, g)$ определяется ограниченный оператор $F : H_2^k \rightarrow H_2^{-l}$, а именно, каждому $f \in H_2^k$ ставим в соответствие функционал $M_\varphi f \in H_2^{-l}$, действующий на $g \in H_2^l$ как $(M_\varphi f, g) = (\varphi f, g)$. Заметим, что M_φ является оператором поточечного умножения на φ , если $\varphi \in D$. Норма элемента φ в пространстве мультипликаторов полагается равной норме оператора M_φ .

Выделим в $M[k, -l]$ подпространства $M_0[k, -l]$ и $\mathring{M}[k, -l]$. $\mathring{M}[k, -l]$ определим как замыкание пространства основных функций D по норме $M[k, -l]$.

Подпространство $M_0[k, -l]$ по определению будет состоять из элементов φ таких, что оператор M_φ является $(-\Delta + 1)^{\frac{k+l}{2}}$ -ограниченным с произвольно малой относительной нормой, иными словами, для произвольной $f \in H_2^k$ выполнена оценка

$$\|M_\varphi f\|_{-l} \leq \varepsilon \|(-\Delta + 1)^{\frac{k+l}{2}} f\|_{-l} + C(\varepsilon) \|f\|_k.$$

В дальнейшем будет использоваться интерполяционная теорема для шкалы гильбертовых пространств H_2^s . Она нам понадобится в следующей формулировке (см., например, [1]):

Теорема об интерполяции. Пусть задан линейный оператор $F : D \rightarrow D$, и имеют место оценки

$$\|Ff\|_{s_1} \leq C_1 \|f\|_{t_1},$$

$$\|Ff\|_{s_2} \leq C_2 \|f\|_{t_2}.$$

Тогда при $0 < \alpha < 1$ выполнена оценка

$$\|Ff\|_{\alpha s_1 + (1-\alpha)s_2} \leq C_1^\alpha C_2^{1-\alpha} \|f\|_{\alpha t_1 + (1-\alpha)t_2}.$$

Перейдем к описанию свойств пространств $M[k, -l]$.

Сразу же заметим, что пространства $M[k, -l]$ и $M[l, -k]$ совпадают. Действительно, оценки

$$|(\varphi, f\bar{g})| \leq C \|f\|_k \|g\|_l \quad \forall f, g \in D$$

и

$$|(\varphi, f\bar{g})| \leq C\|f\|_l\|g\|_k \quad \forall f, g \in D$$

выполняются одновременно.

Из вышесказанного и интерполяционной теоремы немедленно следует

Лемма 2. *Если $k_2 < k_1$ и $k_1 + l_1 = k_2 + l_2$, то $M[k_1, -l_1] \subset M[k_2, -l_2]$, и $\|\cdot\|_{M[k_2, -l_2]} \leq \|\cdot\|_{M[k_1, -l_1]}$.*

В следующем параграфе нам потребуется следующее утверждение.

Лемма 3. *Если $\varphi \in M[k, -l]$, то квадратичная форма $\varphi_m[f] = (\varphi D^{m-k}f, D^{m-l}f)$ продолжается по непрерывности на H_2^m . Если $\varphi \in M_0[k, -l]$, то $\varphi_m[f]$ подчинена форме $(\nabla^m f, \nabla^m f)$ с произвольно малой относительной гранью.*

Доказательство. Для $f, g \in D$ имеем оценку

$$(\varphi D^{m-k}f, D^{m-l}g) \leq \|\varphi\|_{M[k, -l]} \|D^{m-k}f\|_k \|D^{m-l}g\|_l \leq C\|f\|_m \|g\|_m,$$

что доказывает первое утверждение. Пусть теперь $\varphi \in M_0[k, -l]$. Тогда

$$\begin{aligned} |(\varphi D^{m-k}f, D^{m-l}f)| &\leq \varepsilon((- \Delta + 1)^{\frac{k+l}{2}} D^{m-k}f, D^{m-l}f)_s + C(\varepsilon)(f, f) = \\ &= \varepsilon(Tf, f) + C(\varepsilon)(f, f), \end{aligned}$$

где $T = D^{m-l}(-\Delta + 1)^{\frac{k+l}{2}} D^{m-k}$. Оператор T — дифференциальный порядка $2m$, поэтому он ограничен как оператор из H_2^m в H_2^{-m} , т.е. $(Tf, f) \leq C(f, f)_m$. Следовательно,

$$|(\varphi D^{m-k}f, D^{m-l}f)| \leq \varepsilon_1(f, f)_m + C(\varepsilon_1)(f, f).$$

□

Приведем ряд достаточных условий принадлежности функции пространству $M[k, -l]$. Поскольку $M[k, -l] = M[l, -k]$, то далее без ограничения общности предположим $k > l$. В этом предположении $M[k, -l] \subset H_{2,loc}^{-l}$.

Лемма 4. *Если $k > n/2$, то $H_2^{-l} \subset \overset{\circ}{M}[k, -l]$, причем $\|\cdot\|_{M[k, -l]} \leq C\|\cdot\|_{-l}$.*

Доказательство. Для начала докажем следующее утверждение:

Пусть $k > n/2$. Тогда для любого $k \geq l \geq -k$ и произвольной пары функций $f, g \in D$ выполнена оценка

$$\|fg\|_l \leq C\|f\|_k\|g\|_l.$$

Для $l = k$ это утверждение приведено в [8]. Для $l = -k$ оно доказано в главе 1. Теперь для произвольного l из $(-k, k)$ утверждение получается путем применения интерполяционной теоремы к оператору умножения на f .

Вернемся к доказательству предложения. Пусть $\varphi \in H_2^{-l}$. В наших предположениях для произвольных $f, g \in D$ верна оценка

$$|(\varphi f, g)| \leq \|\varphi\|_{-l}\|fg\|_l \leq C\|\varphi\|_{-l}\|f\|_k\|g\|_l,$$

откуда $\|\varphi\|_{M[k, -l]} \leq C\|\varphi\|_{-l}$. Поскольку D плотно в H_2^{-l} , выполнено включение $H_2^{-l} \subset M[k, -l]$. $\square$

Лемма 5. Пусть $k \leq n/2$, $\gamma \leq l$ и $p > \frac{n}{k+l-\gamma}$. Тогда $H_p^\gamma \subset \mathring{M}[k, -l]$ и $\|\cdot\|_{M[k, -l]} \leq \|\cdot\|_{\gamma, p}$.

Доказательство. Доказательство аналогично доказательству теоремы 5 статьи [10]. В качестве крайних мультипликативных оценок надо взять

$$\|\varphi\psi\|_{0,1} \leq \|\varphi\|_{0,2}\|\psi\|_{0,2}$$

и

$$\|\varphi\psi\|_{L,2} \leq \|\varphi\|_{K,2}\|\psi\|_{L,2},$$

где $K = n/2 + \varepsilon$, $L = K \frac{l}{k}$. Первая оценка — это неравенство Гельдера, вторая доказана в лемме 3.3. Полилинейная интерполяционная теорема (см. [9]) даст оценку

$$\|\varphi\psi\|_{l, p'_1} \leq \|\varphi\|_{k,2}\|\psi\|_{l,2},$$

где $p'_1 = \frac{n+2\varepsilon}{n+2\varepsilon-k}$. Эта оценка доказывает вложение $H_{p'_1}^{-l} \subset M[k, -l]$ при $p_1 \geq \frac{n}{k}$. Вложение $H_p^{-\gamma} \subset M[k, -l]$ при $p \geq \frac{n}{l+k-\gamma}$ следует из теоремы вложения Соболева. $\square$

Лемма 6. Пусть $k < n/2$, $\gamma \leq l$ и $p \geq \frac{n}{k+l-\gamma}$. Тогда $H_p^\gamma \subset \mathring{M}[k, -l]$ и $\|\cdot\|_{M[k, -l]} \leq \|\cdot\|_{\gamma, p}$.

Доказательство. Доказательство по сути аналогично доказательству теоремы 6 статьи [10]. Перечислим отличия:

Проверяться будет оценка

$$\|\varphi\psi\|_{l,s} \leq \|\varphi\|_{k,2} \|\psi\|_{l,2}$$

для $s = n/(n-k)$, $k \leq l$, $k < n/2$. В качестве параметров $\eta_{1,2}$, $\rho_{1,2}$, $q_{1,2}$ берем

$$\begin{aligned} 0 < \eta_1 &< \max\left\{\eta, \frac{n}{p} - k\right\}, & \eta_2 &= \eta - \eta_1, \\ \rho_1 &= \frac{2(n-k)}{n + 2(|j| + \eta_1 - k)}, & \rho_2 &= \frac{2(n-k)}{n - 2(|j| + \eta_1)}, \\ q_1 &= 2\rho_1, & q_2 &= 2\rho_2. \end{aligned}$$

Неравенство

$$\|\varphi\|_{|j|+\eta_1, \rho_1 s} \|\psi\|_{|m|+\eta_2, \rho_2 s} \leq C \|\varphi\|_{k,2} \|\psi\|_{l,2}$$

следует из теоремы Соболева ввиду неравенств

$$k - (|j| + \eta_1) \geq \frac{n}{\rho_1 s} - \frac{n}{2}, \quad l - (|m| + \eta_2) \geq \frac{n}{\rho_2 s} - \frac{n}{2},$$

проверяемых непосредственно. $\square$

Лемма 7. Пусть φ зависит от p переменных и принадлежит пространству $M[k, -l]$ в $\mathbb{R}^p$, а функция ψ зависит от q переменных и принадлежит $L_\infty(\mathbb{R}^q)$. Тогда функция $\varphi(x)\psi(y) \in M[k, -l]$ в $\mathbb{R}^{p+q}$ и справедлива оценка

$$\|\varphi\psi\|_{M[k, -l]} \leq \|\varphi\|_{M[k, -l]} \|\psi\|_{L_\infty}.$$

Если же $\varphi \in M_0[k, -l]$, то и $\varphi\psi \in M_0[k, -l]$ в $\mathbb{R}^{p+q}$.

Доказательство. Дословно повторяет доказательство теоремы 8 статьи [11]. $\square$

Теорема 8. Пусть оператор L вида (1) таков, что для его главной части L_0 выполнена коэрцитивная оценка (2) (например, L_0 сильно эллиптивен и его коэффициенты непрерывны). Пусть функции $c_{\alpha,\beta}$ при $|\alpha| + |\beta| < 2m$ принадлежат пространствам $M_0[m - |\alpha|, -(m - |\beta|)]$. Тогда оператор L корректно определен как секторальный оператор в $L_2(\mathbb{R}^n)$, причем замыкание области определения квадратичной формы этого оператора совпадает с H_2^m .

H_2^m . Если последовательности гладких функций $c_{\alpha,\beta,n} \in D$, $|\alpha| + |\beta| < 2m$, сходятся к $c_{\alpha,\beta}$ по норме $M[t - |\alpha|, -(m - |\beta|)]$, то операторы L_n с коэффициентами $c_{\alpha,\beta,n}$ сходятся к оператору L в смысле равномерной резольвентной сходимости. При этом спектры $\sigma(L_n)$ сходятся к спектру $\sigma(L)$ сверху. Если же L_0 — симметрический оператор, а $c_{\alpha,\beta}$ — компактные мультипликаторы в указанных пространствах, то имеет место обычная сходимость спектров.

Доказательство. Эта теорема следует из теоремы 1 и замечания 1. $\square$

Следующее утверждение можно считать основным результатом этой статьи. В формулировке используется понятие сходимости спектров сверху и снизу. Соответствующие определения можно найти в книге [4].

Теорема 9. Пусть главная часть L_0 оператора L есть равномерно сильно эллиптический оператор с непрерывными коэффициентами, а коэффициенты $c_{\alpha,\beta}$ являются распределениями, причем

$$\begin{aligned} c_{\alpha,\beta} &\in H_p^{|\alpha|-m} \quad \text{при } |\alpha| \geq |\beta|, p > \max\{2, \frac{n}{m - |\beta|}\}, \\ c_{\alpha,\beta} &\in H_p^{|\beta|-m} \quad \text{при } |\alpha| \leq |\beta|, p > \max\{2, \frac{n}{m - |\alpha|}\}. \end{aligned}$$

В случае $m - |\alpha| \neq n/2$ ($m - |\beta| \neq n/2$) допускаются также значения $p = \max\{2, \frac{n}{m - |\beta|}\}$ ($p = \max\{2, \frac{n}{m - |\alpha|}\}$). Тогда оператор L корректно определен как m -секториальный оператор в $\mathfrak{H}$. Если $c_{\alpha,\beta}^n(x)$ — гладкие функции, сходящиеся в указанных пространствах $H_p^{|\alpha|-m}$ к $c_{\alpha,\beta}$, то L является равномерным резольвентным пределом соответствующих регулярных операторов L_n . Спектры $\sigma(L_n)$ сходятся к $\sigma(L)$ сверху, а если главный оператор L_0 симметричен, то имеет место и сходимость спектров снизу.

Доказательство. Это утверждение есть следствие леммы 5 и предыдущей теоремы. Нужно лишь заметить, что умножение на гладкую функцию с компактными носителем есть компактный мультипликатор. Но тест-функции плотны в соболевских пространствах $H_p^{|\alpha|-m}$, поэтому умножение на функцию из этих классов будет также компактным мультипликатором в $M[t - |\alpha|, -(m - |\beta|)]$, если число p удовлетворяет условиям теоремы. Теорема доказана. $\square$

Список литературы

- [1] Ж.-Л. Лионс, Э. Мадженес, *Неоднородные граничные задачи*, М., Мир, 1971.
- [2] Г. Фикера, *Теоремы существования в теории упругости*, М., Мир, 1974.
- [3] К. Иосида, *Функциональный анализ*, М., Мир, 1967.
- [4] Т. Като, *Теория возмущений линейных операторов*, Москва, Мир, 1972.
- [5] Халмош П, *Гильбертово пространство в задачах*, М.: Мир, 1970.
- [6] Х. Трибель, *Теория интерполяции, функциональные пространства, дифференциальные операторы*, М., Мир, 1980.
- [7] О. В. Бесов, В. П. Ильин, С. М. Никольский, *Интегральные представления функций и теоремы вложения*, М.: Наука, 1975.
- [8] В. Г. Мазья, Т. А. Шапошникова, *Мультипликаторы в пространствах дифференцируемых функций*, Л., Изд. ЛГУ, 1986.
- [9] J. Bergh, J. Löfström, *Interpolation Spaces*, Grund. der math. Wiss, Berlin, Springer Verlag, 1976, V. 223.
- [10] Дж.-Г. Бак, А.А. Шкаликов. Мультипликаторы в дуальных соболевских пространствах и операторы Шрёдингера с потенциалами-распределениями // Матем. заметки, 2002, V.71. No.5. с. 643–651.
- [11] М. И. Нейман-заде, А. А. Шкаликов, *Операторы Шрёдингера с сингулярными потенциалами из пространств мультипликаторов*, Матем. заметки, Т. 66, N 4, 1999, с. 599–609.